

醫心方卷第二十五

從五位下行鐵博士夏丹波介丹波宿禰康賴撰

小兒方例第一

小兒新生祝術第二

小兒去衝血方第三

小兒與月草湯方第四

小兒與朱蜜方第五

小兒與牛黃方第六

小兒與乳方第七

小兒哺穀方第八

小兒初浴方第九

小兒新齋方第十

醫心方卷第二十五

從五位下行鐵博士兼丹波介并收宿祢康賴撰

小兒方例第一

小兒新生祝術第二

小兒去衝血方第三

小兒與甘草湯方第四

小兒與朱蜜方第五

小兒與牛黃方第六

小兒與乳方第七

小兒哺穀方第八

小兒初浴方第九

小兒新齋方第十

小兒去鴉口方第十一

小兒新連舌方第十二

小兒刺懸癰方第十三

小兒變逆法第十四

小兒擇乳母方第十五

小兒為名字方第十六

小兒初看衣方第十七

小兒調養方第十八

小兒禁食方第十九

治小兒解顙方第二十

治小兒亞陷方第二十一

治小兒搖頭方第二十二

治小兒發下生方第二十三

治小兒白禿方第二十四

治小兒頭瘡方第二十五

治小兒鬼鼓頭方第二十六

治小兒身面瘡方第二十七

治小兒面背瘡方第二十八

治小兒耳聾方第二十九

治小兒耳瘡方第三十

治小兒聾耳方第三十一

治小兒耳百虫入方第三十二

治小兒耳蟻入方第三十三

治小兒耳臭方第三十四

治小兒耳蚰蛇入方第三十五

治小兒目不明方第三十六

治小兒目赤痛方第三十七

治小兒眼眵爛痛方第三十八

治小兒眼翳方第三十九

治小兒雀盲方第四十

治小兒目眩方第四十一

治小兒目竹木刺方第四十二

治小兒目生草沙衣方第四十三

治小兒眼為物撞方第四十四

治小兒驚口方第四十五

治小兒口瘡方第四十六

治小兒口下黃肥瘡方第四十七

治小兒唇瘡方第四十八

治小兒緊唇方第四十九

治小兒口紫方第五十

治小兒重舌方第五十一

治小兒舌上瘡方第五十二

治小兒舌腫方第五十三

治小兒雀目方第卅

治小兒目竹木刺方第卅二

治小兒眼為物撞方第卅四

治小兒口瘡方第卅六

治小兒唇瘡方第卅八

治小兒口緊方第五十

治小兒舌上瘡方第五十二

治小兒齒脫生方第五十四

治小兒齒肉出血方第五十六

治小兒鼻塞方第五十八

治小兒喉痹方第六十

治小兒津頰方第六十二

治小兒雞乳方第六十四

治小兒齋不合方第六十六

治小兒齋赤腫方第六十八

治小兒腹痛方第七十

治小兒疳病方第七十二

治小兒疔癰方第七十四

治小兒腹中有虫方第七十六

治小兒陰腫方第七十八

治小兒下血方第八十

治小兒陰頰方第八十二

治小兒脫肛方第八十四

治小兒穀道瘡方第八十六

治小兒疳疔方第八十八

治小兒疳疔方第九十

治小兒夜啼方第九十二

治小兒驚風方第九十四

治小兒目赤方第卅一

治小兒目生草沙衣方第卅三

治小兒驚口方第卅五

治小兒口下黃肌瘡方第卅七

治小兒唇緊唇方第卅九

治小兒重舌方第五十一

治小兒舌腫方第五十三

治小兒齒落復不生方第五十五

治小兒鼻衄方第五十七

治小兒鼻鼻疔方第五十九

治小兒喉疔方第六十一

治小兒吐乳方第六十三

治小兒風不乳哺方第六十五

治小兒齋中付吐方第六十七

治小兒齋瘡方第六十九

治小兒腹脹方第七十一

治小兒疳疔方第七十三

治小兒五疳方第七十五

治小兒陰腫方第七十七

治小兒陰瘡方第七十九

治小兒陰囊腫方第八十一

治小兒吳頰方第八十三

治小兒穀道瘡方第八十五

治小兒疳疔方第八十七

治小兒疳疔方第八十九

治小兒容疔方第九十一

治小兒驚風方第九十三

治小兒驚風方第九十五

治小兒陰頰方第百十二

治小兒吳頰方第百十三

治小兒脫肛方第百十四

治小兒穀道瘡方第百十五

治小兒穀道瘡方第百十六

治小兒口瘡方第百十七

治小兒口白方第百十八

治小兒痼病方第百十九

治小兒疳病方第百二十

治小兒容忤方第百二十一

治小兒夜啼方第百二十一

治小兒驚悸方第百二十三

治小兒羈啼方第百二十四

治小兒驚病方第百二十五

治小兒傷寒方第百二十六

治小兒卒死方第百二十七

治小兒疳病方第百二十八

治小兒數歲不行方第百二十九

治小兒四五歲不語方第百三十

治小兒元氣方第百三十一

治小兒大腹疝方第百三十二

治小兒霍亂方第百三十三

治小兒泄利方第百三十四

治小兒白利方第百三十五

治小兒赤利方第百三十六

治小兒赤白痢下方第百三十七

治小兒瀉利方第百三十八

治小兒大便不通方第百三十九

治小兒小便不通方第百四十

治小兒大便血方第百四十一

治小兒小便血方第百四十二

治小兒淋病方第百四十三

治小兒遺尿方第百四十四

治小兒身黃方第百四十五

治小兒赤瘡方第百四十六

治小兒腹脹青黑方第百四十七

治小兒赤瘡方第百四十八

治小兒瘰癧方第百四十九

治小兒疣目方第百四十九

治小兒身上癩方第百五十一

治小兒身癢方第百五十二

治小兒盜汗方第百五十三

治小兒隱疹方第百五十四

治小兒丹瘡方第百五十五

治小兒赤遊腫方第百五十六

治小兒身腫方第百五十七

治小兒惡核腫方第百五十八

治小兒瘰癧方第百五十九

治小兒諸瘡方第百六十

治小兒瘰癧方第百六十一

治小兒附骨疽方第百六十二

治小兒癰疽方第百六十三

治小兒代指方第百六十四

治小兒疥瘡方第百六十五

治小兒癰瘡方第百六十六

治小兒浸淫瘡方第百六十七

治小兒隱疳方第百廿四

治小兒丹瘡方第百廿五

治小兒赤遊種方第百廿六

治小兒身胖腫方第百廿七

治小兒惡核腫方第百廿八

治小兒瘰癧方第百廿九

治小兒諸瘰方第百廿九

治小兒癰方第百三十

治小兒附骨疽方第百三十

治小兒癰疽方第百三十一

治小兒代指方第百四十

治小兒疥瘡方第百三十五

治小兒癰瘡方第百四十六

治小兒浸淫瘡方第百四十七

治小兒癰瘡方第百四十八

治小兒王灼瘡方第百四十九

治小兒月蝕瘡方第百四十九

治小兒凍瘡方第百五十

治小兒條瘡方第百五十

治小兒癰瘡方第百五十一

治小兒惡瘡方第百五十二

治小兒金創方第百五十三

治小兒湯火灼瘡方第百五十三

治小兒竹木刺方第百五十四

治小兒落床方第百五十四

治小兒食不飽方第百五十五

治小兒吐食方第百五十五

治小兒吐血方第百五十六

治小兒咳嗽方第百五十六

治小兒食食骨瘦方第百五十七

治小兒食肉骨瘦方第百五十七

治小兒食草芥瘦方第百五十八

治小兒飲水極難方第百五十八

治小兒食食長繞咽方第百五十九

治小兒誤吞錢方第百五十九

治小兒誤吞針方第百六十

治小兒誤吞物方第百六十

治小兒誤吞艾方第百六十一

治小兒誤吞銀方第百六十二

治小兒誤吞竹木方第百六十三

小兒方例第一

小品方云黃帝云人年六歲以上為小十八以上為少女以上為壯
以上為老也其六歲以前者經所不載是以乳下嬰兒病難
治者皆无所求也中古有巫斯五小兒顱窻經以古文壽刺
疾死生在相傳有少小可焉

今案大素經云小兒初生為嬰能哭為孩脈

經義解云小兒初生為嬰能哭為孩脈

產經云凡兒生當長一尺一寸重十斤

小兒方云黃帝元年六歲以上為小十八歲以上為少廿歲以上為壯
以上為老也其六歲以前者經所不載是以乳下嬰兒病難
治者皆无所系也中古有巫觋五小兒顱窻經以古文壽
疾死生互相傳有少小可焉

今案大素經云小兒初生為嬰能哭為厥脈

經義解云小兒初生身赤子

產經云凡兒生當長二尺一寸重十斤

針灸經云十歲小兒七十老人不得針足及背

千金方云凡新生兒七日以上周年以還不過七壯壯如雀矢大

小兒新生祝術第二

產經云凡兒初生時即祝曰天為父地為母領金錢九十

九令兒壽

凡小兒初生仍以菽其手掌曰考理壽千歲至二千石乃起

之大吉若可當為天子王侯活紀卿相者而隨其相若

之乃可起檢之吉

小兒去銜血方第三

產經云兒初生落地急撈去口中血上銜血即時不去須

臾血凝吞入兒腹中百病

千金方云兒生口中有血即當去之不去者而得吞之或病

小兒與甘草湯方第四

千金方云兒新生出腹先以指新口中惡去之便以浴新

解袍託去朱家也取甘草如半寸指一節計行碎末

二合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之如朱蜜法連吮計可

得一蜺殼入腹心兒當快吐云胃中惡汁也吐後信見

飢渴項復更與之若前服及更與並不吐者但指與盡

此一合吐得吐思付令兒心神智慧无病都不吐者是不

含唇血耳勿復與之小兒方同之

小兒與朱蜜方第五

產經云小兒初生三日可與朱蜜方令兒鎮精神魂魄真朱精

二合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之如朱蜜法連吮計可
得一蜺殼入腹心兒當快吐云胃中惡汁也吐後信見
飢渴項復更與之若前服及更與並不吐者但稍與盡
此一合止得吐惡汁令兒心神智慧无病都不吐者是不
含惡血耳勿復與之上品方同之

小兒與朱蜜方第五

產經云小兒初生三日可与朱蜜方令兒鎮精神魂魄真朱精
煉研者如大豆多以赤蜜一鹽殼和之以綿纏沾取與兒吮之
得三沾止一日令盡此一豆多耳作三日與之則用三大豆多也
勿過此量過則復兒也

今案小品方云不宜多則令兒脾胃冷腹脹

小兒與牛黃方第六

產經云朱蜜與麝香可與牛黃益肝膽除塊定驚
辟惡氣也作法如朱蜜多少一法同也小品方同之

小兒初與方第七

產經云凡乳兒女當枕臂與乳頭平膏乳不然則令兒嗜
乳乳兒當先施去宿乳以乳兒之不然令兒吐乳可利
兒先以手按乳令散其熱乃乳兒之若不然乳汁奔走於
兒咽令兒棄乳成疾也

凡乳兒母欲寐者則棄其乳恐覆兒口鼻兒不知飽令致
兒困也

凡乳兒煩不欲大飲則令兒吮乳若吐乳者當以空
乳之則消復不去熱乳以乳令兒飲送冬不去寒乳令

兒哭下利

凡母新乳以乳令兒常熱腹滿

母新內以乳令兒羸弱胎不能行致兒

母新以乳令兒身熱腹滿致兒

母新以乳令兒喜發氣病

兒嘔下利

凡母新乳令兒喘急腹滿

母新肉以乳令兒羸去脛不能行斂兒

毋新辭以乳令兒身熱腫滿效兒

女新得乳令兒喜茂氣病之極

母有疾以乳令兒變黃不能食

女有疾行以乳令吮病瘳狂

母新生下以乳令兒虛羸

凡兒初生乳母食猪鷄鮮菜胞五以乳兒者令兒傷善

凡乳母過醉及房室喘息乳兒者此最爲劇能斂兒真慎之

夫五情善惡不一神之所稟无非乳哺而生化者也一所以乳兒

直能慎之其乳母黃髮黑齒目大雉聲眠精濁者多淫

邪相也其椎項高鼻長口大臂胫多毛者心不悅相

也其手之醜惡皮厚肉強齒齲口鼻色赤如絳者勝

男，桐也。其身體恒令尤有洞澤皮，屢无肌而瘦癯。

者多病相也

又有漏脈數恒遲
胡苑之癰疔也
曰无著
瘰癧易之痛
有諸瘰癧生瘡
瘻者上脉瘻

𩵑音清
聲敗
𪔐鼻下者鼻
息完也
龍耳破者
齒敗
齙音土
食齒
瘰癧瘰癧

瘡瘡腐癰眩痼者是醜疾相也

又其本命生年與咒无射如此諸惡相者便可飲乳

不隨此法害與不吉

凡乳兒頓飲大飽則令兒吐

小兒哺穀方第八

產經云凡小兒生三日後應開腹助穀神可研米作

飲如乳酪狀抄如大豆粒大与兒咽之咽三豆許止日三

与之七日可與哺十日始哺如來拔許廿日悟之五十

不隨此法害兒不吉

凡乳兒頓飲大飽則令兒吐乳

小兒哺養方第八

產經云凡小兒生三日後應開腹助穀神可研米作

飲如乳酪狀抄如大豆粒大與兒咽之咽三豆許止日三

與之七日可與哺十日始哺如來挾許廿日倍之五十

日如彈丸許百日如棗許若乳汁少者不從此法當

用意少增之

今案本草云以如梧子十六枚唯

彈丸一枚

一云日後可乃始哺令兒无疾也若早與哺者兒頭面變

喜生瘡及令兒虛羸難長若兒大小隨宜哺增減良

凡小兒不眷哺者勿遽與之哺不隨便致疾也

又云初哺小兒良日

五寅 五辰 五丑 五酉 皆大吉

又云男以甲乙 女以壬癸吉

又云以戌收哺宜滿日義曰保日皆吉哺兒終身无疾

吉 義曰壬癸 庚辰 保日甲午 乙巳

又云哺小兒忌日

五戌 五巳 五亥 丁日大凶

又戊戌 戊辰 執用日時大吉

小兒初浴方第九

產經云小兒初生時洗浴以牛乳小置湯中令兒至老无疾

一云香脂大如指投湯中浴之 大佳香脂是半脂也

又云小兒初生以序頭背漬湯中洗浴之令兒不病

又云小兒初生以洗浴以金銀珍寶珠至等投湯中兒者為貴

尊大吉

又云小兒初浴湯法桃根李根梅根三物以水煮取汁洗

浴兒却諸不祥令兒身无瘡大吉 今案千金方云以猪膽一枚投

小兒初生方第九

產經云小兒初生時洗浴以牛脂小置湯中令兒至老无疾

一云香脂大如指投湯中浴之
大佳香脂是半脂也

又云小兒初生以序頭骨漬湯中洗浴之令兒不病

又云小兒初生以洗浴以金銀珍寶珠至等投湯中兒者為貴

尊大吉

又云小兒初浴湯法桃根李根梅根三物以水煮取汁洗

浴兒却諸不祥令兒身无瘡大吉

今案千金方云以猪膽投湯中浴兒終身不患瘡疥

又云凡小兒浴數者令兒背脊發痼若久不痊者令兒

毛落急復令啼呼之間三日浴之良

又云浴小兒良日

壬寅卯申酉 又甲寅未申酉 丁酉 庚申 庚辰

皆吉令兒終身无疾病長壽大吉

又云浴小兒良日

庚戌壬子 甲子 庚辛 壬寅 庚辰 壬未 庚辰

又男壬戌日 壬子日大吉 又辛丑日 辛酉 夜半大吉

小兒新磨方第十

產經云凡兒新磨法以銅刀新之吉磨當令長六寸長

則傷肌短則傷歲

凡兒初生當即舉之遲舉則令兒寒中腹中雷鳴先浴之

然後新磨裹之吉

千金方云新磨當令長至足夫短則中寒令腹中不調當

下利

又云裹磨法推治帛布令柔軟方四寸新綿厚半寸与

布等合之調其緩急令兒吐乳兒生廿日乃解初磨

若十日許兒終啼似衣中有刺此或磨燥遇刺其腹當

解勿衣更裹磨時當閉戶下帳燭火左右令帳中

溫暖兒衣令溫粉之此謂冬時寒也若磨不愈燒擬

千金方云新席當令長至足夫短則中寒令腹中不調當
下利

又云裹席法推治帛布令柔軟方四寸新綿厚半寸与
布等合之調其緩急令兒吐乳兒生廿日乃解視席
若十日許兒終啼似衣中有刺此或席燥刺其腹當
解勿衣更裹席時當閉戶下帳燭火左右令帳中
溫暖兒衣令溫粉之之此謂冬時寒也若席不食燒擬
墓令成灰中粉磨未

小兒去鴿口方第十一

產經云凡初生兒口中舌上有白物如米屑名為鴿口及鼻
外之有此由兒在胞中之時其母嗜食糯米使之然也
此物當時不去之兒得吞者化為虫也宜便去之治之方以
豉經叙頭佔并花水擦拭之三四日如此便脫去也猶不去
者可煮栗樹皮用如上法皆良

一云叙頭者在者屠獲水中勿令兒口中落入吞小兒口同之
奕師方云小兒鴿口來自什和胡粉塗之

小兒新連方第十二

產經云兒初生之時有口中舌下腫如石榴子中障者連其
舌下當時不搗新者後喜令兒言語不發轉舌也治之方
可以乳搗新之微有血出无害若血出不止者可燒豉作末
傅之血止良小兒方名之連舌

小兒刺懸癰方第十三

產經云小兒初生後三日其血氣收斂成害則口舌類裏頰
淨也若唯裏方上有物如盧穉穉水狀者名懸癰有
氣脹起也又有看舌下如此者名為重舌又有上脣如此
者名為重脣又有看齒齦如此者為重齦皆刺去血止

傳之血止良十品方名之連舌

小兒判懸癰方第十三

產經云小兒初生後一日其血氣收斂成害則口舌類裏頰
淨也若唯裏舌上有物如蘆穰感水狀者名懸癰有
氣脹起也又有看舌下如此者名為重舌又有上脰如
者名為重脰又有看齒齦如此者為重齦皆刺去血行
之良

治奇以綿纏長針未子如粟以刺決之令氣泄之去積黃
針足一刺之消且一日不消又刺之不過三刺自有小兒
小兒變氣第古

病源論云小兒變氣者以長血氣也變者上氣也者變者
變者有輕重其輕者體熱而微驚耳令體之令

上脰頭白兒起如死與目珠子微汗平者而歌速者九
日乃歌遠者八九日乃歌其重者體壯熱而脈亂或行或不行不欲食

無吐乳无所若也變氣之時目白精微赤黑精微白之
无所苦菜畢自明了矣先變五日後五日為十日之中變乃

除耳初變之時熱甚者或連日數不歌審計日數名也
變氣服里嚴茂行熱不止者服紫丸小兒便止勿復服

之其變氣之時遇寒加之即寒文平腹痛文稿歸不
以煮熨之則愈變氣與溫壯傷寒相似若非變氣身

熱耳熱體熱此乃為他病可為餘治審是變氣不
得為餘治也其變氣日數出病源論

又變氣者脣頭白完起如死與目珠子微汗平者而
歌速者九日乃歌

兒生廿二日始變者耳熱也至廿四日再變者且黃
狀同歌端心也第二變氣時或目白者赤黑者微白變

至畢月便精明矣至九十六日三變者候母乳之而也
也至一百廿八日四變者且黃能笑哭也至一百廿五日五

得為餘治也其變逐日數出病脈論

又變逐者脣頭白完赴如死矣目珠子微行平者而
歌遠者九日乃歌

兒生廿二日始變者耳熱也至廿四日再變者且
狀同欲端心也第二變逐時或目白者赤黑者微白變
逐畢目便精明矣至九十六日三變者候母乳之而也
也至一百廿八日四變者且逐能笑也至一百廿五日五
變以成機剛也至一百九十二日六變者且逐以知五株成
也至二百廿四日七變以知剛固也至二百五十六日八變者
且逐以知學語矣至二百八十八日九變以知亭心也凡九
變三逐也至三百廿日十變者且逐積三百廿日小逐
畢後至四百日大逐後百廿日復逐積五百七十六日大
小逐畢乃成人也所以變逐者時是榮其血脈攻其
五藏故一變竟輕變情能有異者也

凡逐之候身壯熱脈亂汗出目精不明微欲驚不乳
哺上脣頭小白完赴如死矣目珠子耳令尻赤令此
其証也此者五日歌遠者八九日歌也當審計其逐日
不可針灸服藥

凡兒變之時不欲驚動勿令過多人也小兒變時或早
或晚也

凡兒生三月不逐則耳聾目昏五月不逐身不行九月
不逐五株不成此為痿癱不能行之疾也

產後云脈決曰凡小兒變逐之時行出不用食者輒吐乳
而脈亂无可若也

葛氏方云凡小兒生後六十日目瞳子成能笑識人百五
日任脈生能又度百八十日尻骨成能獨坐二百一十日
掌骨成能匍匐三百日髕骨成能獨倚三百六日
日為一晷膝骨成能乃能行

不五株不成此為痿癱不能行之疾也
產後云脈決曰凡小兒變星之時行不用食輒吐而脈亂无可若也

葛氏方云凡小兒生後六十日目瞳子成能笑識人百五日任脈生能又度百八十日尻骨成能獨坐二百一十日常骨成能匍匐三百日髓骨成能獨倚三百零日為一晷膝骨成乃能行

治小小初變星時有者服之效于已心黑散方

杏仁二分 大黃一分 麻黃二兩 去節

右三物先搗大黃麻黃下篩杏仁令如脂內散令調更廉篩之盛以毒囊廿日兒以汁和之如小豆一分事

凡易吞厚衣范之令行一出畢下張燃火解衣溫粉之百日兒取散如來板大以小陽和服之汗出之後

消息如上法當服溫粉不可解衣乃溫粉也

治已服黑散發熱不歇服之契小兒便心勿復與紫丸方

赤石脂一兩 巴豆一枚 代赭一兩 桑葉一枚 子辛枚去皮

右四物先治已豆杏仁搗三千杵乃內代赭赤石脂更

搗三千杵純也藥契即成一方云相和与少蜜和之

盛以蜜器无令藥燥則无契以巴豆杏仁自丸常若

能盡屑當稍內之令相丸廿日兒服如黍米一丸

小乳之令藥得下却兩食頃乃復乳之分令

飽耳平且一服藥日中契盡日西夕時復小增丸

至雞鳴時若復与一丸愈者止廿日兒服如大黍

米一丸廿日兒服如麻子一丸六七十日兒如胡豆一丸百

兒服如小豆一丸不下故契者增半丸以下利為度

天寸說服紫丸當須先出若不出不完為病未盡當

更服之有契乃服紫丸无契但有寒者熱服乳頭

更服之有契乃服紫丸无契但有寒者熱服乳頭

小兒乳之令藥得下去而食頭乃復乳之令

飽耳平且一服藥日中熱盡日西夕時復小增丸

至鷄鳴時若復与一九愈者止廿日兒服如大黍

米一九卅日兒服如麻子一九六七十日兒如胡豆一九百

兒服如小豆一九不下故熱者增半丸以下利為度

天寸說服紫丸當須先出若不吐不完為病未盡當

更服之有熱乃服紫丸无熱但有寒者熱服乳頭

單當歸散黃耆散變退服藥後發熱者急可與桂枝

黃芩湯方 生清澤可

黃芩湯少小軍變退時服藥下後有朝又熱利除熱可

黃芩兩 月皮六兩 人參兩 干黃六兩 甘草兩

大棗 五枚去核

凡六物切之以水三升煮取一升分三服二日兒服半

合三百日兒服一合日并熱止變退兒有發熱下利

又方經曰天不足西北故令兒腮後合地不足東南故兒體

後生成人法於三故令齒後故腮合乃而言體成乃而行

大陰氣不足而大陽氣有餘者故令兒羸瘦骸脰三

歲乃而行
擇乳母方第十五 備在第七小兒與乳子未

小品方云乳母者其血氣為乳汁也五情善惡血氣所

生也乳兒者待宜慎喜怒夫乳母形色所宜其後甚多不可

患得今但令不利鼻癭痛腫癭氣味蝸蚘癰瘡白

赤癰傷癰瘰癧耳聾鼻臭癰腫无此等病者便

可飲兒也師見其故多盤便知其二病原也

小兒為名字法第十六

產經云

子日生名救 一名壽 丑日生名帶 一名徐 寅日生名令 一名阿

卯日生名官 一名金 辰日生名道 一名阿 巳日生名孟 一名

午日生名徐 一名阿 師未日生名護 一名阿 申日生名多 一名趙

禿癰傷瘻瘻耳聾鼻癰眼无此等病者便
可飲兒也師見其故多盤便知其二病源也

小兒為名字法第十六

產經云

子日生名救一名壽 丑日生名帶一名徐 寅日生名令一名阿

卯日生名官一名金 辰日生名道一名片 巳日生名蓋一名

午日生名徐一名阿師 未日生名護一名 申日生名多一名趙

酉日生名多一名弟 戌日生名他人一名侶

又云正月一日十日廿日宣日宣時生子名為正月子二月二日十日

廿二日卯日午時生子為二月子五月五日十五日廿五日午時

生子名為五月子七月十七日廿七日申日申時生子名為

七月子諸此日月合生者可為名耳

又云以二月五月生者皆不利父母二月生男名女都生女

名惟女一名定女無咎五月生男名連快一名枝紆女名

得華未如此名之无咎是周文王為作神字不好害父書

又云初立名字勿以五子日凶又不以巳日大凶

小兒初着衣方第十七

產經云小兒初着衣法甲子日生子衣以黑衣忌度日 晦日

丙丁日生子衣以青衣忌夜半 戊己日生子衣以綠衣忌甲子

庚辛日生子衣以黃衣忌酉日 中時凶 壬癸日生子衣以白衣忌戊己日 晦時凶

又云小兒初着衣良日辰巳男以甲女以乙吉

又云凡作兒衣勿以新綿縐之損兒氣故宜用故布帛

有人氣者着蓋也兒衣不欲厚多綿之恒如不厚兒其

寒乃為佳耳

小兒調養方第十八

禮記云童子不衣裘裘裘大溫消陰氣使不堪苦不衣裘以便

養生要集云嬰兒之生衣之新縐則骨肉退焉食之集

肉則虫生焉串之縐樂則易傷焉

又云凡作兒衣勿以新綿繒之損兒氣故宜用故布帛
有人氣者看益也兒衣不欲厚多綿之恒如不見兒其
寒乃為佳耳

小兒調養方第十八

禮記云童子不衣裘

裘大溫消陰氣使不堪苦不衣裳以便

養生要集云嬰兒之生衣之新繒則骨柔焉食之集
肉則虫生焉串之逐樂則易傷焉

千金方云小兒始生肌膚未成不可暖衣一一則令筋骨
緩弱不見日風則令肌膚脆軟便易傷皆當以故
絮暑衣之勿用新綿也天和暖无風寒之時令母將於
日中嬉戲數見風日則血氣漸壯肌肉牢密耐風寒
不致疾病若常處在帳中重衣溫暖辟陰地之草
不見風日軟脆不堪風寒

又云養小兒常慎驚勿令聞大聲抱持之間當安祥
勿令怖也

又云天雷暴耳但作餘細聲以亂之

又云凡兒冬不可浴冬生傷寒夏不可浴不浴久傷熱
又云凡兒不能乳哺當雙乳下之小兒氣盛有二病但下之
必无所損若不時下則成疳固難治矣

病源論云薄衣之法當從秋習之不可以春夏平減其
衣則令中寒後秋習之以漸猶寒如此則冬無寒冬月但
當着兩薄襦一複裳耳常令不忍見其寒適佳耳
愛而臠之過所以害之也

又云當消息无令汗出一一則致虛損便受風寒晝夜寤
寐皆當慎之

產經云凡養小兒法随大人身之寒溫而養之随天時寒
溫減增之能察其微之又不用新綿帛新者過昂有
患兒故也

當着兩薄襦一複裳耳常令不忍見其寒適佳耳
愛而臠之過所以害之也

又云當消息无令行出、則致虛損便受風寒晝夜寤寐皆當慎之

產經云凡養小兒法随大人身之寒温而養之随天時寒温增减之能察其微之又不用新綿帛新者過昂有患兒故也

凡小兒衣其寒薄者則腹中乳食不消、則其大行解、是此故為一解之術也便將雙丸以微情之

凡小兒大行黃而晁者此是腹中有熱故宜將服龍骨湯良凡小兒不節哺乳者則病易後下之則傷胃氣令腹脹滿再三下尚可過此則傷小兒矣

凡小兒冬日下為无所畏夏日下不羗難治恠有疾者不可不下夏日下之後腹中常當小脹滿故當節哺乳將護之數日自愈矣

凡小兒不使溺竈上令兒陰生瘡難治
小兒禁食第九

產經云小兒食諸害令兒腹中生瘕難治

又云小兒齒未易蜜及粘糖不可与食令兒齒朽壞難易齒不堅

又云小兒不可与食物鼠殘物令兒口中生白瘡死

又云小兒不可与食板木成諸藥令兒生寒熱及瘰癧

養生要集云大豆炒小麦勿与一歲以上十歲以下小兒喜食壅而死也

又云凡男子年十五以下不得飲冰沆漿腠理未成故成病又云小兒未断乳不可啖鷄肉生蛇虫令躰瘦

崔禹錫食經云大麦麵勿与一歲以上十歲以下小兒其毒氣壅去寒而死

又云小兒不可与食板未成諸藥令兒生寒熱及癰瘰
養生要集云大豆炒小麦勿与一歲以上十歲以下小兒喜氣壅
而死也

又云凡男子年十五以下不得飲冰沍漿腠理未成故成病
又云小兒未断乳不可啖鷄肉生就生之令躰瘦

崔禹錫食經云大麦麵勿与一歲以上十歲以下小兒其毒氣
雍^塞寒而死

孟詵食經云黍不可与小兒食之不能行

又云小兒食蕞菜便覺脚痛

獲敬本草注云粟^粟解孩兒令齒不生

本草拾遺云小兒食之脚屈不能行

又云小兒食蕞脚弱不行

治小兒解顙方第廿

病源論云解顙者其狀小兒年大亞應合顙縫^而解是也
由腎氣不成故也腎主骨髓而腦為髓海腎氣不成
則髓腦不足不能結成

產經論云細辛一分 桂心一分 干薑五升

凡三物以乳汁和塗上下復塗

僧深方云取猪牙車骨髓塗上日二十日

小品方云生蟹腎 白薇各二升

凡二物下煎以乳汁和塗上立愈

千金方云熟地脫末和猪類車中髓塗上日三四

葛氏方燒驚萎末傅良

極要方云防風^白 白芨 栢子人 各二升

右為散以乳汁塗上日一十日知廿日合

又方灸瘰上下半寸^{新錄方}

治小兒此陷方第廿一

病源論云小兒此陷此謂此陷下不平也由腹內有熱

千金方云救地脫未和猪類車中髓塗上日三四

葛氏方燒驚藥末傅良

極要方云防風白發各二分栢子人

右為散以乳汁塗患上日一十知廿日合

又方灸瘰上下半寸公新錄方

治小兒胎胎方第廿一

病源論云小兒胎胎上胎此謂胎胎下不平也由腹內有熱

氣壅藏熱則竭便引飲而小兒泄利者則府藏血氣虛弱不

能上充髓腦故胎胎也

千金方云灸瘰上下各半寸及灸足大陰各一壯

今案五遺付經云足大陰穴在內踝後白肉際陷骨宛中

治小兒搖頭方第廿二

子母秘錄云治小兒長搖頭方 楊腦以摩頭即寒

治小兒駝不生方第廿三

病源論云小兒稟生足少陰之血氣不足則駝踈薄不生

又有目頭創而充落不生

小品方椒葉中无多少楊枝取汁塗頭上產後用之

新錄方云以蜜和猪毛灰塗之即生

又方蓮子草汁塗之驗

又方桑上寄生汁塗之生

千金方云蜀椒根楊作末和鴈月猪脂付和服之佳

治小兒白秃方第廿四

病源論云白秃之狀頭上白點斑利初似一癬而上有白皮痛

生痴生瘡頭發充落謂之白秃

葛氏方云燒解臭末以酒汁和傅之

又方未煎薑橘膏和塗之

產後之灸以來灰汁淨洗之末白灰灰和塗之良

小品方云楊椒葉中心取汁以塗頭生

胎小兒白禿方第廿四

病源論云白禿之狀頭上白點斑利初似癰而上有白皮痛生痂生瘡頭發禿落謂之白禿

葛氏方云燒鄒糞末以醬汁和傅之

又方未梨蘆豬膏和塗之

產後之疾以來灰汁淨洗之末白灰灰和塗之良

小品方云搗椒葉中心取汁以塗頭生

極要方云搗芫花以豬脂和如泥灸洗去病塗之

錄驗方云取鮫白脂傅之

千金方云不中水並煮桑葉燒作灰和豬脂塗之

又方亭脂子細末先洗而洗之

又方桃樹青皮搗和酢陳之

胎小兒鬼故頭方第廿五

病源論云人有風邪在於頭有偏虛處那髮落肌肉枯死或如錢大或如指大髮不生故謂之鬼故頭

千金方云狸骨燒末以豬脂和塗之

產後之亂髮如鴨子大一枚鄒糞一頭苦茶一兩 附子一枚

雄黃二兩 豬膏四升

凡六物搗碎下用膏煎發更令盡內諸藥末投之

傳瘡上良

胎小兒頭瘡方第廿六

病源論云府藏有熱氣上衝於頭而復有風濕乘之濕熱相搏折血氣血變生創

瘡要方云胡粉膏主之

胡粉

八銀名

松脂

豬膏

各

右煎成去滓內水銀胡粉和調塗瘡上日三次人乳塗之

今案千金方云銀膏在下条

產經云梁上塵下篩麻油和先洗瘡畢拭燥傅上

病源論云府藏有熱氣上衝於頭而復有風濕乘之濕熱相搏折血氣血變生創

樣要云胡粉膏主之

胡粉

水銀各

松脂

猪膏

各

右煎成去滓內水銀胡粉和調塗瘡上日三次人乳塗之

今案千金方云銀膏在下条

產經云梁上塵下篩麻油和先洗瘡畢拭燥傳上

僧深方云燒竹葉和雞子白傳之不過三食

養教本單注云生翳胡麻塗之大効

葛氏方云雞屎燒治為末和猪脂付之

劉涓子方云取臘月猪屎燒末傳之良

經心方治小兒一切頭瘡久即直瘻不生加藥蘆黃方

黃連八分

藥蘆二分

黃蘗八分

煨石灰

雄黃八分 松脂八分

六味以猪膏二升燒與合調先以赤龍皮湯洗付之

子母秘錄云竹葉燒灰和雞子白付之

僧深方云不過三食之

范汪方治小兒頭創面亦有創日月益甚方

黃連 赤小豆熬分等作屑和猪膏塗之

千金方治小兒頭瘡經年不愈方

松脂六分

大黃四分

苦茶五分

黃連二分

胡粉四分

凡五味下篩以猪膏和研水銀散傳上

徐之才方云白帝瘡小兒頭上瘡團然白色者是也大蘇

搗白殿早朝付之

治小兒頭面身疥瘡方第廿七

病源論云府藏熱盛熱氣衝發皮膚而外有風濕折

与血氣相搏則生瘡其狀初赤起痛癢後乃生膿

汁隨差隨發或生身疥或出頭面或身疥頭面皆有

之者

徐之才方云白帝瘡小兒頭上瘡腫之然白色者是太赫
指白殿早朝付之

治小兒頭面身躰瘡方第廿七

病源論云府藏熱盛熱氣衝發皮膚而外有風濕析
與血氣相搏則生瘡其狀初赤起瘡^瘡後乃生膿
汁隨老隨發或生身躰或出頭面或身躰頭面皆有
之者

千金方云水銀膏主之

今案核要方云胡粉膏在頭瘡条

葛氏方取兒父禪倪汁以浴之勿令兒及母知也

范汪方治小兒頭創面点有創日月益甚方

黃連

赤小豆熬令毒作屑和猪膏塗之

廣利方療小兒面上忽生瘡黃水方

黃連三分

胡粉三分

甘草一分炙

三味以猪脂和以帛貼瘡上一日一

又方鄒食一頭燒作灰^和以酒汁塗上

集驗方丹茱萸素以東流水煮以冷良

治小兒面白屑方第廿八

產經云茱萸根白皮煮取汁洗

又方以刀廿刻穀樹取其汁塗白處上一日三四

今案樊石和酒付之尤良

治小兒耳鳴方第廿九

病源論云小兒耳鳴頭眩有風令耳鳴

產經昌蒲散方

昌蒲

為頭配各

凡二物為散以綿裹塞耳日再易

治小兒耳瘡方第卅

病源論云小兒創生於兩耳時老時叢必有膿汁是風
濕搏於血氣所生也

痼源論云小兒耳鳴頭眩有風令耳鳴
產經昌蒲散方

昌蒲

為頭眩各

凡二物為散以綿裹塞耳日再易

治小兒耳瘡方第卅

痼源論云小兒創生於兩耳時老時叢必有膿汁是風
濕搏於血氣所生也

千金方云燒馬骨灰付之

又方付鷄矢白

產經云小兒耳有惡瘡及有惡客生耳中可

雄黃六分 曾青二分 黃芩一分

凡三物合下篩以綿耳中以綿塞耳中汁出復傳良

治小兒耳方第卅一

痼源論云小兒腎藏盛而有熱者熱上衝於耳津液
癰結則生膿汁必有因飲浴水入耳內而停積搏
於血氣蘊結成熱今有膿汁皆謂之聾耳

集驗方云挑拔中人熱指末以裹塞耳常用良

効驗方云燒杏仁黃香塞耳

又方黃連 煨石 下篩如棗核吹入耳中立止

產經云搗桂末以真膏和塞耳不過三四日

又方拿下灰吹入耳中令入深无苦即自出良

治小兒耳中百虫入方第卅二

產經云以苦酒灌之便出

又方油鴨灌耳中良

又方水灌之

又方煮麻子綿裹塞耳即出

又方挑菜付灌耳中

又方以草帶錐鉤向耳孔兩諸虫皆出

治小兒耳蟻入方第卅三

產經云以苦酒灌之便出

又方油酌灌耳中良

又方水灌之

又方煮麻子綿裹塞耳即出

又方批葉付灌耳中

又方以草帶錐鉤向耳孔兩諸虫皆出

治小兒耳蟻入方第廿三

產經云桑猪膏香物入耳孔邊自出良

治小兒耳吳公入方第廿四

產經云以穀樹葉裹塩灸令煖掩耳孔令擦之即出

治小兒耳蚰蛇入方第廿五

產經云胡麻煮以葛囊枕之虫聞香即出

治小兒目不明方第廿六

尿驗方治小兒眼花不見物方

集驗付目鯉鮒等良

治小兒目赤痛方第廿七

產經云黃連七枚

人乳汁合

漬付之

今案極要方无乳黃連數分等用之

又方竹瀝汁三合人乳汁一合和以綿取藥拭目

又云小兒目赤淚出不止灸足大指上叢毛中名大都

葛氏方云搗薔菜取汁以注目中

尿驗方云鯉魚膽付之良

治小兒眼骨爛痒方第廿八

產經云治小兒傷風骨肉赤爛痒經年不愈青銅散方

取大銅錢一百文以好酒洗并炙錢令乾煖刮取屑下篩稍以

眼骨

治小兒眼翳方第廿九

產經云治小兒眼有翳翳大小兒年五六歲眼童子猶

不堅不宜輒付食翳散上單付珊瑚散取如粟米大

治小兒眼目爛痒方第廿八

產後三治小兒傷風目赤爛痒經年不愈青銅散方
取大銅錢一百文以好酒并煎煉令乾燥刮取屑下篩稍留
眼目

治小兒眼翳方第廿九

產後三治小兒眼有郭翳大小兒年至五六歲眼童子猶
不堅不直輒付食翳散上單付冊脚散取如粟米大
內翳上一日再

又方宜單付馬珂散皆令精細好厚蜜

治小兒雀目方第卅

病源論云人有晝而精明至曉便不見物謂為雀目
言如鳥雀瞋便无所見也

千金方云至黃昏時看雀宿處打驚之雀起飛乃
咒曰紫公我還汝宿汝還我明如此三日瞋三週為之
眼明也秘法也

產後三治小兒定雀宿處夜令雀驚起之日雀自去

之如此三日即愈

又方大豆七枚和一種以二物暮向於牕牕口曰公
是甲得雀目夜无所見故欲汝眼汝許與之我

護汝眼誦王通說則以和量孔口則曰我得量
圖夜能視豆穗置牕房而赴去之如此三夕驗秘術

新錄方云鯉魚鮓與磨付並良

治小兒目眩第卅一

產後三治小兒目眩鼻孔中隨目左右以鼻翳翳之其肉
目仰寤寐頃刻不復如眩處有驗

又方早赴對戶內再拜跪言戶門狹小不足宿客愈之
又方吞蠶沙一枚即愈

治小兒目眩未刺方第卅二

新錄方云鯉魚鮓魚鮓竹並良

治小兒目眩第卅一

產經云以猪脂看鼻孔中隨目左右以鼻翳睛之說因目仰寤寐頃刻不復如眩處有驗

又方早赴對戶內拜跪言戶門狹小不足宿客愈之
又方吞蠶沙一枚即愈

治小兒目竹木刺第卅二
產經云鮓魚二以繩貫以水煮令爛取汁灌目中即愈

治小兒目差草沙石入才第卅三
產經云研好墨以新筆注瞳子上良

又方取麥法任目中
又方燒翹帶末服方寸匕五出

治小兒眼為物種方第卅四
產經云炙羊完慰之勿令甚熱元羊用猪完良

又方好黃連去毛細切以人乳汁漬令黃色如大豆許
看目中作卧勿覆之甚佳

治小兒驚風方第卅五
病源論云小兒驚風口兩吻生瘡此由脾胃有客熱上

氣煙於口兩吻生瘡目日也如驚風子之吻故名為驚口
千金方秋云燒錢以和猪脂塗之

又方揪白皮及區帖上四五度

治小兒口瘡方第卅六

病源論云小兒口瘡由血氣感風將養過溫心有客
熱、煙上雖故口生瘡

產經云取有賊真骨燒作屑以乳汁和塗口中瘡上

葛氏方云桑白汁塗瘡上一日夜十餘過
產經之塗乳以飲

博濟安胎方以白契石灰塗之

又方牛膝炙根嚼與含之

治兒口瘡方第廿六

病源論云小兒口瘡由血氣感風將養過溫有客
熱、煙上雖故口生瘡

產經云取有賊真骨燒作屑以乳汁和塗口中瘡上

葛氏方云桑白汁塗瘡上一日夜十餘過產經之塗乳以飲

博濟安胎方以白礬石灰塗之

又方牛膝炙根燭煎含之

桂嬰方云取赤葵莖炙為末蜜和含之

獲敬本草注云檳榔煨作灰傅之

治小兒口下黃肌瘡方第廿七

病源論云小兒有涎壅多者其汁流溢浸漬於頰生瘡

黃汁出浸淫肥滿挾熱者創計則多

千金方云治小兒口下黃肌瘡方

熬竈上飯令煙熏未傅之

治小兒唇瘡方第廿八

葛氏方云葵根燒末付之

經心方云蟾蜍燒末付之

治小兒緊唇方第廿九

單要方云澤蘭心煎以付之

又方肉桂上指塗之

治小兒口瘡方第卅

病源論云小兒中風口瘡者是風入頰項之筋故也

錢鑒方云脹竹瀝汁二合分溫四服

又方桑白膏穴

儒醫方取雀矢白丸如麻子狀之即愈

千金方鹿角粉大豆末分等和塗乳飲兒

治小兒重舌方第五十一

病源論云小兒重舌者心脾熱故也其狀附舌下如舌而短故謂

葛氏方以兒暑箕中東向乃中灸其舌三灸

缺驗方云眼竹瘰疔二合分溫四小

又方各百膏穴

儒醫方取雀矢白丸如麻子脹之即愈

千金方鹿角粉大豆末分等和鹽乳飲兒

治小兒重舌方第五十一

病原論云小兒重舌者心脾熱故也其狀附舌下如舌而短故謂

葛氏方以兒暑箕中東向內中灸箕舌三炷良

又方金月下五若頂和傳舌下

小品方以赤小豆屑酒和傳舌上

又方燒訖錢作末傳舌上良

又方用以栗哺之良

徐大山方亂帶燒灰末付之

極要方取蒲黃傳上良

又方取衣中白冥炷作屑傳舌下

產經云以銀針刺舌上腫者令血出勿刺大脉

又方燒馬扇根若頂和鹽上

治小兒舌上瘡方第五十二

病原論云小兒若心虛有熱舌上生瘡也

小品方用烏賊炙骨燒屑以雞子黃和塗喉下及舌下也

今案產經云以乳竹和鹽上

又方清旦赴所來木令白汁之鹽乳以飲兒

治小兒舌腫方第五十三

病原論云小兒舌腫者心脾俱熱氣鼓於口故舌腫也

千金方金月下五若末和酥塗舌上

又方滿口含糖酥少時熱氣通食

治小兒齒脫生方第五十四

病原論云齒是骨之所終而為髓之所養也小兒有稟

不足者則不能死於齒骨故久不生也

治小兒舌腫方第五十三

病源論云小兒舌腫者心脾俱熱氣聚於口故舌腫也

千金方金月下黑末和酥塗舌上

又方滿口含糖酥少時熱氣通食

治小兒齒脫生方第五十四

病源論云齒是骨之所終而為髓之所養也小兒有稟不足者則髓少不能充於齒骨故久不生也

葛氏方以薄蛇編繩向東磨齒處微令破即生甚神驗
採要方雌鼠矢二十七枚以一鼠矢杖齒處盡二十七枚以廿日

齒常生

今案小品方雌鼠矢一頭大一頭小是也

獲敬本草注云人尿中竹木以心且刮之即生也

治小兒齒落不生方第五十五

產經云取牛矢中大者二三枚小者兩枚以住齒處即生

治小兒齒間出血方第五十六

治小兒齒間出血方第五十六
范汪方取生薑實之以血塗斷上及齒肉便愈有驗

治小兒鼻衄方第五十七

病源論云小兒經脈血氣有熱毒令鼻衄也

採要方取香馬矢薄綿裹塞鼻中

又方燒髮作灰少許吹入鼻中

產經云阿膠令泔水煮枯額上良

又方書額上言令口血急即止

又方書額上言血出不止流入東海良

治小兒鼻塞方第五十八

病源論云小兒風冷氣入於頭腦停滯鼻肉則氣不宣和結聚不通故鼻塞也

產經云小兒患鼻塞不通有兩方

杏人二分

蜀椒一分 附子一分半

細辛一分

凡四物改阻以享若屑五合煮一兩明且以成煎猪

又方書額上言血出不止流入東海良

治小兒鼻塞方第五十八

病源論云小兒風冷氣入於頭腦停滯鼻則氣不宣和結聚不通故鼻塞也

產經云小兒患鼻塞不通有兩方

杏人二分 蜀椒一分 附子一分半 細辛一分

凡四物改咀以厚苦酒五合漬一宿明旦以成煎猪肝五兩破大上藥各附子並膏成綿絮絞去滓以鹽炙中月再

又板兒頭髮寬上左右以膏摩十數週良

千金方治鼻痛方恒以油塗鼻內外

又方塗藕佳

治小兒鼻息完方第五十九

產經云治少小鼻息完通草散方

通草一兩 細辛一兩

凡二物下篩展綿如裹袂以藥如小兒者綿頸內

鼻中月二

又方樊石二兩 今藥千金方細辛二兩云一

治小兒喉痹方第六十

病源論云小兒喉痹是風毒之氣客於咽喉之間與血氣相搏而細腫痛甚者腫塞飲粥不下乃成膜血也

產經取香扇燒灰以水服大良

又方翫帶作繩繫頸愈

千金方 桂心二分 杏人一兩

凡二味為散綿裹如束大咽其汁

又方煮大豆汁含之

治小兒臍方第六十一

血也

產後取膏扇燒灰以水腫大良

又方翹帶作繩繫頸愈

千金方 桂心二分 杏仁一兩

凡二味為散綿裹如束大咽其汁

又方煮大豆汁含之

治小兒驚風方第十一

病後論云小兒驚風由哺乳令氣入胃與胃氣相逆令
折胃氣不通則驚也

千金方云生薑汁生乳各五合二服取五合分三服

治小兒驚風方第十二

病後論云律頤之病是小兒多近強流公債於頤下也
葛氏方取東行牛口中沫塗兒口

又方楊庚用熬大如豆者吞下

千金方來白汁塗之

玄感方牛口中飼草咬付佳口中

治小兒吐乳方第十三

病後論云小兒吐乳者由乳哺令熱不調故也

應驗方取來根付着付口中即愈

又方取新牛矢水使付少飲兒大良

經心方常以空乳則消

聖惠方治吐乳黃連

用並根付滴豆大入中立見

又方用新契馬糞使取付半合灌之効

治小兒難乳方第十四

病後論云小兒初生血兒咽入腹令心腹否滿兒不
能飲乳謂之難乳

又兒在胎之時氣入胞兒生則腹痛不肯飲乳

聖惠方治吐乳黃連

用並根汁滴豆大入中宜其

又方用新契馬屎使取汁半合灌之効

治小兒難乳方第六十四

病後論云小兒初生血兒咽入腹今腹否滿兒不
能飲乳謂之難乳

又兒在胎之時氣冬一氣入胞兒生則腹痛不肯飲乳
名難乳

千金方炒鹿角末知小豆署舌下殺之與之

又方崔氏四枚末署乳頭飲之大兒十枚

治小兒風不乳哺方第六十五

錄驗方最生竹付朕之師老知任海也

博濟女衆方小兒吐乳方

人參二兩 橘皮二兩 生薑二兩

以水一升半煮取八合細服之

治小兒膈不食方第六十六

千金方蜂房灰末付之

又方燒亂帶灰和膏付之

又方大車輪晒燒作灰日一付之

治小兒膈中付之方第六十七

千金方燒蒼耳子粉之

又方燒蜂房灰散膏中効驗方

甘草二兩 枳實 下篩以粉之

又方樊石 附子各二兩 下篩散膈中曰二

治小兒膈赤腫方第六十八

千金方杏仁二分 猪類車中體二

凡二味先研杏仁如脂付上

治小兒膈膈方第六十九

又方燒蜂房灰敷膏中効驗方

有草二升 搗下篩以粉之

又方燒石附子各二升下篩敷膏中日二

治小兒瘡赤腫方第六十八

千金方杏人二分猪類車中體二升

凡二味先研杏人如附付上

治小兒瘡瘡方第六十九

痼源論云小兒瘡瘡由初生新瘡後俗疥不歸

瘡濕氣在瘡中遇風濕相搏故也

本草云蒿艾莖白毛付之五升

錄驗方可用薑黃蘘蘘散粉之

產經云黃蘗全月下黑各四升未付之

千金方小兒風瘡遂作惡瘡歷年不愈方

付東壁立大佳

又方蜂房灰未付之

葛氏方小兒風瘡及瘡瘡久不愈方

燒亂帶作灰和乳汁傅之

又方未當歸粉之

治小兒腹痛方第七十

痼源論云小兒腹痛多由冷寒之氣與藏相繫故也

千金方梨葉濃煮取湯一服七合可三四与之

又方半夏隨多寢火炮之末同和服如粟粒五合丸

曰三

治小兒腹脹方第七十一

痼源論云小兒腹脹是冷氣容於藏故也

千金方云燒艾如指甲灰塗乳上飲之

又方腹上磨青葉

又方故衣帶燒垢者切升水三升煮取升分服

又方半夏隨多痰火炮之半信和服如粟粒五合丸

治小兒腹脹方第七十一

病源論云小兒腹脹是冷氣客於藏故也

千金方云燒艾如指甲灰塗乳上飲之

又方腹上磨青葉

又方故衣帶饒垢者切一升水三升煮取一升分服

葛氏方粉及鹽分等合熬令變色以磨腹上即愈

治小兒痞病方第七十二

病源論云小兒胃氣壅滯結實腹內有虫飲致令榮衛

痞塞府藏之氣不宣通其病腹內結脹滿或時作

熱是也

葛氏方云若患腹中痞結常壯熱者方

生散集血和桂屑塗上

又方未腐香脂如大豆者

又方大黃各令相如龜甲各令相如伏苓

凡三物分等蜜丸服如大豆一枚日三

以酒下之

又方枳白頭云使囊感以掩痞上

產經云治小兒痞面黃羸瘦丁奚不欲食不生肌膚

心中嘈煩肉發時寒熱五藏腫脹腹中繞臍痛

常苦下八痞九方

桂心 曾青

元伏代

牡蛎

鱧頭甲

頭廣各

干薑

各

蜀漆

細辛

龍膽

附子

凡九物治下節和如梧子服二九日三禁如藥法

本草拾遺云小兒痞三白草枳什服之令人吐

治小兒腹之癖方第七十三

病源論云五藏不和三焦不調有寒令之氣客之則令

乳哺不消化結聚成癖腹之癖結也其狀系之不

動有刑形段者發也推之浮移者瘕也

蜀漆分細辛分

龍膽分附子分

凡九物治下節壅和如梧子服二九日三禁如藥法

本草拾遺云小兒疳三白草搗什服之令人吐

治小兒瘕瘕方第七十二

病原論云五藏不和三焦不調有寒令之氣客之則令乳哺不消化結聚成瘕瘕瘕瘕結也其狀系之不動有刑形段者瘕也推之浮移者瘕也

千金云桑白乳下一寸三粒

又方批樹青皮梅和酢塗目二

又方苟杞根梅作末和猪脂付之和酢塗佳

醫門方梅蘇和酢佳如移餘處隨訖附之驗

本草拾遺云苦瓠取末硬者煮令熟解用射小兒疳瘕

治小兒米瘕方第七十四

產經云治少小米瘕拒飲食米方

雞矢干白米五合

凡二物合炒取米堆搗末以水升頓服取盡斯瘕即

吐出瘕末如研米為瘕若元瘕而吐出白痰水

增米須食米

治小兒土瘕方第七十五

產經治少小食土瘕中作土瘕拒飲食土瘕方

生宗一引以繩繫曳地行數里勿洗便多吐之即愈

治小兒腹中有虫方第七十六

養安方治小兒腹中有虫方

蓋夷作末每食飽多少和少水食之乃止百元可禁

治小兒陰腫方第七十七

病原論云小兒下腫熱氣衝陰頭勿腫合不得

小便乃至生瘡俗云尿火所為也

千金方楊梅瘡方第七十八

治小兒腹中有虫方第六十六
養安方治小兒腹中有虫方

蓋夷作末每食飽多少和少水食之乃止
治小兒陰腫方第六十七

病源論云小兒下疳契氣衝陰頭分腫合不得
小便乃至生瘡俗云尿火所為也

千金方楊梅瘡方第六十八

又方書集麻石末

又方楊梅菜根付之又方酸桃人主酒服方第六十九

治小兒陰痛方第七十

千金方小兒陰痛方第七十一

凡三味合燒以酒灌之及契以氣重之

又方甘草末和乳洗之
極要方濃者炙狼牙根洗之其良

治小兒陰痿方第七十二

產後治小兒陰痿方第七十三

濃者炙狼牙根洗之其良

又方小兒陰頭生瘡似石榴花者方

虎牙 犀角

凡二物刀刮以猪脂煎令變色去滓陰上神良

千金方附胡麻付之

又方蜜煎甘草末之陰上

又方黃連胡椒分等和面脂塗之

葛代方取寬中黃去末以鷄子白和付之

又方濃者煮黃蘗汁漬之

治小兒陰傷血出方第七十四

產後治小兒為物觸傷陰道血出不止方

人頭髮并青布燒作灰以麻油和塗之亦可仍以粉良

又方蜜煎甘草末之塗上

又方黃連胡粉分等和面脂塗之

葛代方取寬中黃去末以鷄子白和付之

又方濃煮黃蘗汁漬之

治小兒陰傷血出方第八十

產後治女小兒為物觸傷陰道血出不止方

人頭髮并青布燒作灰以麻油和塗之亦可仍以粉良

又方石陳刺觸藥塗不及方

蒲黃水和脹之即止

治小兒陰囊腫方第八十一

千金方酢和麴塗之

又方金屑下土和鷄子白付之

醫門方未桂心塗良

又方末大黃和酢塗良

治小兒陰類方第八十二

病源論云類者陰核氣結腫大也小兒患此者多自啼怒

胎氣不止即於陰氣下擊法取不散所發也

千金方灸足厥陰大敦左右各灸七

又方三月上除日白頭公末付之一宿作瘡十日愈

產後方牽陰頭正下上行灸頭兩極又牽下行向穀

道灸所極

又方小兒騎雄軸前膺陰至頭前灸有年位

又云葛代方但灸其上又灸莖上向小腸脈

又方灸手小指頭七壯隨左右也

經心方灸兩足內踝上七寸日七壯

又方但灸其上也

治小兒尾類方第八十三

病源論云尾類者陰核偏腫大也其偏虛者氣虛而

又方小兒騎確軸前膺陰莖額前灸有年位

又云葛氏方但灸其上又灸莖上向小腸脉

又方灸手小指頭七壯隨左右也

經心方灸兩足內踝上七寸日七壯

又方但灸其上也

治小兒疳積方第廿三

病源論云疳積者陰板偏腫大也其偏虛者氣虛而
行故偏結腫也

千金方上莖九治小兒陰腫大卵板及頰方

香豉 牡丹 疔風 挂心 黃蘗 各二兩

凡五疳丸如大豆兒三歲飲五丸日三兒小者以意減之

乳頭与之

治小兒脫肛方第廿四

病源論云小兒患脫肛內出多因利大腸虛冷遂因

驅氣故也

蘇敬本草注云燒藥頭為灰進之

本草拾遺云有以似為藥者蝟牛殼藥頭脫肛皆效

傳之自編

錄驗方取鐵精粉推內之

又方且灸龜尾骨上三七九

葛氏方熬石灰令熟故綿裹坐其上令復易之

儒深方取蒲黃一兩以猪膏和傳之不遇三愈

千金方灸頂上施毛中即入

產後生鐵三斤以水一斗煮取五升以汁洗可三乃止

蒜黃傳上良

治小兒穀道痔方第廿五

子母秘錄云小兒穀道至痔方

大棗取膏和檢長三寸綿裹內孔中明日出之至死

又方胡椒雄黃分等署中

千金方冬頂上施毛中即入

產經云生鐵三斤以水一斗煮取五升以汁後可三乃

蒜黃傳上良

治小兒數道瘡方第八十五

子母秘錄云小兒數道至疳方

大棗取膏和棗長三寸綿裹內孔中明日出之至死

又方胡椒雄黃分等署中

今案煮枇杷皮洗之者煮枇杷皮良

治小兒數道瘡方第八十六

葛氏方治平下部有瘡方

煮豉以漬之

又方穀汁以磨黑豆搗之

治小兒甘濕方第八十七

病源論云甘濕之病多由利脾胃居弱腸胃之間虫動侵食五藏使

子母秘錄云羊脂和漿液下部用猪膽之佳

又方細和胡椒塗之

又方以鐵衣署下部中即差

治小兒寸白方第八十八

小兒寸白者九蟲之內一虫是也因府有虛弱而能發動也

葛氏方蒼朮根二斤細剉水七升煮取二升分再服又

可作糜也一升漬一宿去滓服良驗又方蒼朮汁飲之有驗

今案系之當上

又方濃煮諸糧飲之汁出盡

又方多食極子

今案系之當上

又方研雄黃和酥付之橫梅子之佳

治小兒痢病方第八十九

病源論云痢小兒病也十歲以上為癰十歲以下為痢其

今案張之堂上
又方多食極子
今案千金方極子九枚去皮以月上旬旦
空腹服七枚七日服盡至消成水水果

今案研胡桃人付
產後津液虧去上肢取中白者切碎以水煎服得三升先
又方研金好附子之今案子母秘錄陳實一收內中
又方研雄黃和酥付之橫梅子之佳

小兒痢病方第八十九

病源論云痢小兒病也十歲已上為癰十歲已下為痢其
發之狀或口眼相引而目睛上搖或手足掣或手足
脊痛直或頸項反折諸方諸痢名證不同大較其發
之源皆曰三種者風痢驚風食痢是也風痢
曰衣厚行出而風入為之驚風曰驚怖大降乃發
食痢曰乳哺不節或然小兒氣血微弱易為
傷動曰此三種變作諸痢也
凡諸痢正發手足掣縮慎勿捉持之捉則令曲度不
不隨也

小品方云玄中記云天下有女身一名姑獲又名鉤皇鬼也
喜以陰雨夜過飛鳴徘徊人村里變得素者是也是
身專鳴无雄不產喜落毛羽中塵置人兒衣中便使
兒作痢病必死使化為其兒也是以小兒生十歲衣被
不可露七八月尤忌

常
神農本草經云小兒驚風有百廿種其證候異於

千金方云所以有痢病者皆由歲氣不平故也新
生師痢者是其五歲未收血氣不聚五脉不流故
又云灸之痢法憲中未合骨中隨息動者是故要處
也灸五壯

又云頂上四毛中臆中三鬚膺中毛尺澤旁官伏蹇
三里然谷穴灸之

常

千金方云所以有痼病者皆由藏氣不平故也新
生師痼者是其五歲未收飲血氣不聚五脉不流故
又云冬病法宜中未合骨中隨息動者是故要慶
也冬五壯

又云頂上迴毛中腫中三關膈中毛尺澤勞官伏臑
三里然谷穴灸之

今案明堂經伏兔穴禁灸

又云冬病當先下使兒虛乃灸虛灸之未下有實而灸
者氣通前後不通致人

又云龍膽湯主之 其方在本書第五卷

廣利方按子致痼病不知人迷肉醫作目方

牛黃一大豆許和蜜水服之立効

又方為犀角尖研并水二天合服之立効

枕中方取紙中白葉隨年乳和之即愈

治小兒痼病方第九十

病源論云小兒所以有痼病者婦人懷妊有忌神道其

腹中胎如蟻族而制伏他小兒令病也任娠婦不忌者

能魁人時有此耳後之為疾喜發下寒熱有寒來而

毛髮歸不脫是其證也脫音制

十全方冬伏翼熱醫哺之

篇集切一壯冬依切一壯以水五六升煮六七沸去滓稍

以酒之也 出新錄方

蘇敬本草注云白馬眼藤小兒題如帶之

治小兒容忤方第九十一

病源論云小兒中容忤者是小兒神氣類弱忽有非常

之物或是未經識見之人觸之與兒神氣相忤而發病謂

之容忤也其狀吐下青黃白色水穀解離腹痛及倒

篇集切一此冬依切一此水五六升煮六七沸去滓稍

以酒之出 出新錄

蘇敬本草注云白馬眼縣小兒題女帶之

治小兒容忤方第九十一

病巨論云小兒中容忤者是小兒神氣頗弱忽有非常

之物或是未經識見之人觸之與兒神氣相忤而發病謂

之容忤也其狀吐下青黃白色水穀解離腹痛及倒

文牆面變易五色狀似痼但眼不上搖耳其脉絳急數

者是也若失時不治小兒則難治若乳母飲酒過醉及

房勞後乳者最劇能斂兒也

千金方云少小所以有容忤病者是外人來氣忤忤之

名中人是為容忤也雖是家人或別房異戶雖是乳

父母或從外還衣服或經履鬼神厭惡異氣牛馬之

氣皆為忤也

又云凡小兒衣布帛綿中不得有頭髮履中亦白衣青

帶青衣白帶皆令兒中忤

又云凡非常人及物從外來之驚小兒欲防之法諸有從外

來人及異物當持兒避之勿令見也若不避者燒牛天灰令

常相置戶前則善治之方

馬矢三升燒令煙絕以屑三升煮三沸去滓浴兒

又方燒女衣帶三寸并燬合乳汁服之

樵要方蚯蚓尺寬中黃土等分為散水和塗兒頭上及手心

又方取銅鏡昇煙令赤看小兒面中代飲之小兒又能飲金之屑愈

小品方吞腐香如大豆之愈

取雞馬矢一丸洗取汁飲之見下便愈

又方取衣中白糞十枚末以塗女乳頭令兒飲之入咽即愈

葛氏方令兒仰臥以小兒暑胃上燒翹散於乳中大減即愈

產經云牛黃如大豆研飲之即効

治小兒夜啼方第九十二

病源論云小兒夜啼者歲令故也更有犯觸禁是令兒夜啼

龍所方取鏡繫床脚即愈

夜陰氣盛與冷相并則動

與青氣相搏或煩或痛

又取銅鏡昇燈合煮看小計國中代飲之小兒又能飲金更平愈

小兒方吞腐香如大豆之愈
取漿馬矢一丸洗取汁飲之見下便愈
又方取衣中白果十枚末以塗乳頭令兒飲之入咽即愈

葛氏方令兒仰臥小兒暑冒上燒翹散於乳中大減即愈
產經云牛黃如大豆研飲之即効

治小兒夜啼方第九十二

病源論云小兒夜啼者藏令故也更有犯觸禁是令兒夜啼
龍所方取鏡繫床脚即止
夜陰氣盛與冷相并則陰動
與陽氣相搏成煩或痛令
兒夜啼也一平

又方書磨上作田字亮
小兒方少小夜啼至明即安夜
夜報啼者散方
本云方已三九三物下
日兒未眠服者以乳汁和之
服如麻子一丸兒大能服則者服二
方以意為度

產經真朱少許以水和塗腹上

又方取車膏著磨中

集驗方取空井中草懸戶上勿令女知

今案本草拾遺云井口邊草潛者女卧席下勿令知

玄感方取升天半許女卧席下勿令女子俱知吉

葛氏方取犬頸下毛縫囊裏以繫兒兩手立止

又方暮取兒衣以繫柱
物以繫兒衣令愈 小方

千金方以任身時食飲偏有所思物哺兒愈

本草拾遺云寢中玄及四文道中玄合末以飲小兒辟夜啼

治小兒驚風方第九十三

病源論云小兒驚風者是其於眠睡裏勿然啼而驚為覺

也由風熱邪氣乘於心藏精神不安故卧不安則驚也

產經云真朱少許以水和塗腹良

葛氏方搗栢子人乳一升圭飲之

千金方用服乳散反

又方車轄肝肉口中磨中

又方燒帽皮三寸反著乳頭飲之

治小兒驚風方第九十四

病源論云小兒在胎時其母將養傷於風寒邪氣入胞傷

兒藏府故兒生之後邪獨在兒腹內邪動與正氣相搏

葛氏方搗栢子人乳一刀圭飲之
千金方偏脹亂發反

又方車轄肪內口中膺中
又方燒帽皮三寸反着乳頭飲之

治小兒羈蹄方第九十四

病源論云小兒在胎時其母將養傷於風寒邪氣入胞傷
兒藏府故兒生之後邪猶在兒腹內邪動與正氣相搏
則腹痛故兒羈張盛氣而啼也

千金方取新出馬矢一丸絞取汁含之

又方燒猪矢沸湯淋取汁浴之并与少杆飲之

治小兒虎病方第九十五

病源論云虎病者復傷於日者至秋風邪乘之發小兒
未能觸胃於暑之病瘧者是乳母抱持解脫不避風也

千金方生鹿角末煮先服一錢上

又方燒蟬甲偏脹寸寸匕至發時服三匕并大炙身

葛氏方臨發時搗大附子并苦酒塗臍上

又方石上冒蒲漉煮浴兒

今案集驗方桃葉二十七枚葉心上艾各葉上十四枚

葛氏方恒山四分小麥三合淡竹葉切一升右以水

煮取一升服之

今案產注云此生冊錄曰至十日者五服或
至百日服二合半或至二百日一服三合

產注云師左半持水碗右持刀子正面於北兒曰北斗

七星主知一切死生之命屬北斗之君王也甲病瘧

勿令流行誦三遍訖禹步就病兒前令視瘧中師則

吐呵以其持刀刺瘧中兒數急如律令勿令及顧

且秘驗過病後取刀子范注方同是

又法額面骨脊上皆筆作天公字骨上書作地

產經云師左半持水擦右核下三處才見紅

七星主知一切死生之命屬北斗之君王甲病瘡

勿令流行誦三遍訖禹步就病兒前令視瘡中師則

吐呵以其持刀刺瘡中兒數急如律令勿令及顧

且秘驗過病瘡後取刀子范汪方是

又法額面骨脊上皆筆作天公字骨上書作地

太山之下有不流水上有神龍九頭九尾不食餘物

正食瘡鬼朝食一千石暮食五百一食不足遣我來

索瘡鬼聞之已眠走行千里用朱書之

治小兒傷寒方第九十六
產經云治小兒傷寒頭痛方

主為行六谷竹歷六合
凡二物相和者而三歲兒分三服

治小兒卒死方第九十七
葛氏方治小兒卒不知何所疾痛而不知人便絕死方

取雄雞冠血臨兒口上割令血出應兒口喉便活

子母秘錄鹽湯極鹹作服下取吐即活
大青熱湯和灰搗封之即活

范汪方焚馬天丸使取付吞兒下喉愈

治小兒住胎方第九十八
病源論云住之言住也謂其邪氣留人身內也

千金方云取竈突中灰三指撮煖末分吞服之

治小兒數歲不行方第九十九
病源論云小兒生自變逆至於能語隨日數五脈骨節

偷成其臍骨成則能行骨是髓之四肢若重

生血氣不充故其骨不形成而數歲不能行也

千金方取喪家未用尸時盜取其骸以哺兒不過三

病源論云住之言住也謂其耶氣留人身內也

千金方云取寔突中灰三指撮煖末分等服之

治小兒數歲不行方第百九

病源論云小兒生自變逆至於能語隨日數五脈骨節

偷成其臍骨成則能行骨是髓之四者

生血氣不充故其骨不序成而數歲不能行也

千金方取喪家未用尸時盜取其飯以哺兒不過三

日即行勿令人知之今棄小兒方取東哺之日三便起

治小兒四五歲不語方第百

病源論云人之五歲有五聲脾之聲為言小兒四五歲

而不能言者內在胎之時其母卒有驚怖內動於

兒藏耶氣乘其脾使脾氣不和故也

千金方灸足兩踝上三壯

又方末亦小豆和酒塗布下

治小兒無辜方第百一

病源論云小兒面黃髮直時壯熱飲食不生肌膚積經

日月遂致死者謂之无辜言天上有身名无辜晝

伏夜遊兒後小兒衣席露之經宿此身則飛後上過

而取此衣与小兒着并席与兒卧便令兒看此病也

崔侍御方以醋煮大黃末為丸服之甚驗

治小兒大腹下痢方第百二

病源論云小兒大腹下痢病者由哺食過度而脾胃

尚弱不能磨消故也其病腹大頸小黃瘦是也

葛氏方取生並根搗以猪膏煎藥稍服之

又方乾桑根定若伏翼定以哺之

獲效本草注云牛脂中毛燒服之

鉄駿方甘草十八分一物下篩蜜和為丸一歲兒服如小豆

粒廿九日二三不食及乳服盡更合

治小兒霍亂方第百三

尚弱不能磨消故也其病腹大頸小黃瘦是也

葛氏方取生並根搗以猪膏煎服之

又方醵冬罌定若伏翼定以哺之

獲教本草任云牛齋中毛燒服之

鉄驗方甘草十八分一物下篩蜜和為丸一歲兒服如小豆

粒廿九日三三不食及乳服盡更合

治小兒霍亂方第百三

病源論云小兒腸胃嬌弱同解脫逢風令乳哺不消而

變吐利也或乳母觸胃風令食生冷物時令氣流入

乳飲之立成霍亂

牛近灌口中一合也

又方醵牛矢汁含之

又方研屎滓乳上服之三刀圭日三

產婦人參湯方

人參四分 厚朴二分 甘草二分 白朮三分

凡四物以水升二合煮取五合五寸日兒一服合百日兒分三服

千金方治小兒吐利方 亂後之方 鹿角一升 末米汁服之三刀圭

鉄驗方煮厚朴服之

又方煮厚朴服之

治小兒泄利方第百四

病源論云甚令氣盛利甚為洞下

千金方炒倉米三服之

又方石榴燒末服一錢上日三

千金方治小兒泄利晝夜不止

黃芩二分 干薑二分 人參二分

下篩蜜丸如大豆服三九日三

鉄驗方治小兒泄利腹中不調方

薤白切七合 人參切八分 厚朴四分 粟三合

凡四物以水四升煮取二升稍飲之

又方石榴燒末服一錢上日三
產後黃芩丸

黃芩二分 干薑二分 人參二分

下篩蜜丸如大豆服三九日三

銀驗方治小兒患利腹內不調方

薤白切七合 人參切八分 厚朴四分 粟三合

凡四物以水四升煮取二升稍飲之

葛氏方主赤小豆和苦酒塗臍下

又方猪完炙噉之

本草拾遺云食菰為驚甚良

治小兒白利方第百五

病源論云凡利色青白黑皆為冷色黃赤是熱也

產後灸足內踝下腎陰三壯隨兒小大增減

子母秘錄云厚朴八張各四分

以醋漿半大升煮取二合分五服與之

治小兒赤利方第百六

龍門方張子赤利方

薤白切三合 炙子七枚 香豉二合

水二升煮取六合分三服之

博濟安胎方蓋青汁五合分服

治小兒赤白痢下方第百七

千金方搗石脂汁服之

又方蜂房灰服之

又方鯽魚一頭燒末服之

提要方薤白一把 香豉升水二升煮取升三服之

本草拾遺云鯽魚主水穀不調下利

又方掃小兒食之止下利

千金方搗石搗汁服之

又方蜂房灰服之

又方鯉魚一頭燒未服之

又方燒骨未服之

搗要方雁白一把香豉五升水三升煮取一升三服之

本草拾遺云鯽魚鱗主水穀不調下利

又方掃小兒食之止下利

產經云龍骨三兩研如米以水三升煮取一升五合服多少任意

又方大棗廿枚以水三升煮取二升去滓服之

子母經云云子母利方每兩可寧三兩以水一大升煮取五合飲之

產經治小兒血尿方

取生地黃汁升分四五服之

千金方藍青汁一合分四服之云貴利蓋法治之貴方在治區長方中

治小兒大便不通方第百九

病源論云小兒大便不通者府藏有熱乘於大腸故也

葛氏方取蜂房熬末以酒居水服少許

又方以白集玉磨磨下至陰

治小兒小便不通方第百十

葛氏方取衣中白集玉磨磨中內湯道中橫骨又佳也

又方取故席少許煮一升以水三升煮取一升去滓飲之

千金方車前子半升小麦一升二味煮為粥服日三

又方葵莖子久在一升水四升煮取一升內滑石一分研服

半合日三異書唐下名

子母秘錄治小兒尿不通方聖藥

補苗滑石下篩以酒服方寸匕日二

產經治小兒未滿十日煩不得小便方

燒蜂房服之

又方蒲黃一升以水和佳橫骨上良

半合目三

子母秘錄治小兒尿不通符

墨書

唐下名
朱書

効驗方

補苗

滑石

下篩以酒服方寸匕日二

產經治小兒未滿十日煩不得小便方

燒蜂房服之

又方補苗一升以水和塗橫骨上良

小品方治少小便秘不利莖中痛欲死方

牛膝大把无多少煮作飲之立愈有驗

治小兒大便血方第百十一

大便血方

葛代方割鹿角作屑以米汁服五分匕

日之也

又方燒鵲巢為屑飲之廿許

大便竟出

千金方燒亂帶未塗乳飲之

又方燒車釐一枚赤肉一升水中分二服

信陳方第根二把以水煎煮取半服

治小兒血方第百十二

小便

產經云對症骨溫酒服方寸匕

又方煮大麻根飲之

又方煮白茅根飲之多少任意

小便

千金方燒鵲巢葉灰并花水服之

治小兒淋病方第百十三

病源論云小兒淋者腎与膀胱契也其狀出小便數小腹急痛引

座是也

千金方車前子一升水四升半煮取一升半分三服

又方滑石水煮服之 又方蜂房乱髮分等燒末服

効驗方陳葵子一升水二升煮取一升分三服之

兩錢上

治少小淋症取氣不絕大湯藥者

僧深方云車前子滑石方等治淋甚效清和服半錢上

蜂房一分 吳桂心一分

產是也

千金方車前子一升水四升半煮取一升半分三服

又方滑石水煮服之 又方蜂房乱髮分等煨末服

効驗方陳葵子一升水二升煮取一升分三服之

兩錢上

治少小胎前產後諸病不堪大湯藥者

小兒方按實諸病後兒三歲以上服方寸匕兒小兒意稍服之有驗

產經治少小石淋方

蜂房一分 桂心一分

凡二物治諸腫一刀圭以銅器承溺一与石俱出

治小兒遺尿方第百十四

病源論云遺尿者其由膀胱有冷不能約於水故也

千金方冬廬下一寸半逆半拉

又方小豆葉楊汁服之

葛氏方取蔓草中葶燒服一錢上而毫

治小兒身黃方第百十五

病源論云小兒在胎其母藏氣有熱煙蒸於胎至生兒

時肝黃謂之胎疸

千金方楊五葉根汁五合服之

又方楊葉青汁服之

又方楊葉根汁除隔兒鼻口大豆許

治小兒身有赤瘡方第百十六

病源論云小兒因汗為風邪熱毒所傷与血氣相搏熱氣蒸

發於外其肉色赤而壯熱是也

千金方煮麥米粉合里和服之

又方伏龍肝乱髮灰猪脂和服之

葛氏方燒牛矢塗之

又方雞紆血塗之

治小兒腹皮青黑方第百十七

病源論云小兒因汗腠理則開而為風冷所乘搏於五臟

發散其肉色赤而壯契是也
治小兒身有赤瘡者方
千金方發米粉令黑蜜和塗之

又方伏龍肝亂髮灰猪脂和塗之

葛氏方燒牛矢塗之

又方雞冠血塗之

治小兒腹皮青黑方第百十七
病源論云小兒因行膝理則閉而為風令所繫搏於面隨

肌肉虛寒傷之則面氣沉陷不能榮其皮膚而風令客之

千金方桑落上下左右各去瘡半寸并鳩尾下寸三壯

治小兒平眼皮疳方
又方盾和胡椒塗上若不愈治便更昂死

治小兒赤瘡方第百十八

病源論云小兒有血氣不和肌肉變生赤逆條漸長大無定或

如錢大或圓三數寸
今案小兒瘡注有病源死治方

千金方搗艾胸中取血枯瘡上漸消

又方楊契矢塗之皮自卷落

產經要胡粉和得外向內塗之

又方屋塵臘月猪膏和付之

又方鍛鐵矢以猪膏付之

治小兒瘡瘍方第百十九

瘡源論云治小兒身上瘡易方
石流黃以苦酒研之塗之瘡上日三

又方生枯樓切開以驗苦酒三升並取一升汁塗之瘡上良

此是德家秘方不傳

治小兒疣目方第百廿

病源論云人有附皮膚生与肉色充異如麦豆大謂之

疣目也此多由風邪客於皮膚血氣變化所生故有

藥治之老者忽有法術治之老者而多生於手足

千金方以刀子決目根四面令血出取患瘡人瘡中黃膿

付之勿近水三日即膿潰根動自脫

產經云松脂塗疣上一宿即落良

治小兒疣目方第百廿

病源論云人有附皮肉生与肉色无異如麦豆大謂之疣目也此多由風邪客於皮膚血氣變化所生故有藥治之老者忽有法術治之老者而多生於手足

千金方以刀子決目根四面令血出取患瘡人瘡中黃膿付之勿近水三日即膿潰根動自脫

產後以松脂塗疣上一宿即落良

又方以熨石杵疣上七過即去

又方艾炷小作可灸始生疣上三炷即自去良

又方月晦日於廁前取故草二十七枚投目上訖祝曰今日晦脫驚去勿又顧之不過十日枯死

今案俗人以赤莧汁付之即落或以煮苧布之汁洗之

治小兒身上瘡方第百廿一

切真艾又尺三寸內生熟半之

千金方治小兒身上瘡方

取馬尿洗之日三四度

又方楷破以牛鼻津塗之

治小兒身熱方第百廿二

病源論云小兒血氣盛者表裏俱熱則煩燥不安皮膚發熱千金方米子蒸无多少吹咀以水煮去滓俗兒今案小品方

獲敬本草注云梓白皮主小兒熱瘧身熱煩燥黃陽谷

并散傳之

高氏方治小兒年身熱如犬不能乳哺方

太辛草拾遺云小兒果熱搗水芹取汁塗之

又方生銀小兒諸熱以水磨服切勝紫雪

治小兒盜汗方第百廿三

病源論云小兒盜汗者眠睡而汗自出也若將春過溫目於膝下陰陽氣交津液散泄而眠卧汗自出也

葛氏方以干薑末一分粉三分合以粉之

又方石膏一兩

凡三物粉并合搗下篩以粉身

太平草拾遺云小兒果熱搗水芹取汁進之

又方生銀小兒諸熱以水磨服切勝紫雪

治小兒盜汗方第百廿三

病源論云小兒盜汗者眠睡而汗自出也若將春過溫
目眩汗自出也

葛根方以干薑末一分粉三分合以粉之

小品方黃連三分貝母二分牡蠣二分

凡三物粉并合搗下篩以粉身

集驗方麻黃根三分胡扇燒作屑一分

治合乳汁飲三分匕大人方寸匕日三

小品方同之

治小兒隱軀方第百廿四

病源論云小兒回汗而解脫衣裳風入腠理與血氣相搏

成之結聚起相連成隱軀風氣心在腠理浮淺其熱微故

千金方鹽湯極熱洗絞聚隱之

不腫不痛但成隱軀者

又方鹽沙水煮去滓洗之

產後云治小兒風極隱軀入腹身體腫脹治各干漆方主之

治小兒丹瘡方第百廿五

病源論云風熱毒客在腠理熱毒搏於血莖發於外其皮上

熱而赤如瘰丹故謂之丹也若久不歇則肌肉爛傷也

產後云夫丹者惡毒之氣五色無常不即治轉壞肌完治之可

赤小豆作屑以甘草湯和塗之

今案瘰驗方和麻油塗之

又方麻湯大黃湯主之

瘰驗方取甘蕉根薄之立且腫少許汁

又方搗楸大草薄之 又方取白蠟面傅之

千金方搗赤小豆和鷄子白塗之

又方牛天塗之

又方伏龍肝下篩鷄子白和付之

又方和油塗之

又方麻陽大黃湯主之

錄驗方取甘蕉根薄之之豆腫少許汁

又方搗煨大草薄之 又方取白蠟面傅之

千金方搗赤小豆和鷄子白塗之

又方牛天塗之

又方伏龍肝下篩鷄子白和付之

又方和油塗之

小品方水中苔搗付之

又方芒消內湯中取十枚上

新錄方水若油研支子人採十洗之

又方生薑汁塗之

范汪方以生臭血塗之

蘇敬本草注塗鯉魚良

又方搗薤菜薄之

又方煮栗毛敷洗之

本草拾遺云鵝屎鋪主小兒大人丹毒

又云萍蠹水主小兒丹毒飲一合是打蠹桶中水也

治小兒赤腫方第百廿六

源論云小兒有肌肉虛者為風毒熱氣所乘熱毒搏

於血氣則皮膚赤而腫赴其風隨氣行遊不定故名赤

游腫也

千金方凡小兒赤游行於頸上不治入腹而死治之方

用伏龍肝末和鷄子白塗之易之

葛氏方搗朱研和粥付之

又方米粉熬熟和塗之

華佗方苦薑搗付之

治小兒身赤腫方第百廿七

病源論云小兒腫滿由將養不調腎脾二藏俱虛也其

水腫者皮薄如熟梨之狀若皮膚受風之傳血氣致

用伏龍肝末和雞子白塗于易之

葛氏方掃末研和粥付之

又方米粉熬熟和塗之

華他方苦薑梅付之

治小兒身壯腫方第百廿七

病源論云小兒腫滿由將養不調腎脾二藏俱虛也其

疾水腫者皮薄如熟梨之狀若皮膚受風搏而氣致

腫者但虛腫如吹此風氣腫也

產後取香茅以水煮取汁以漬浴之良

又方赤山豆者炙取汁漬浴甚良

千金方以小便溫漬之良

僧深方取鴈蘆汁溫漬之汁味盡易

治小兒惡核腫方第百廿八

產後治小兒惡核腫壯熱欲死杜麻湯方

升麻一兩 麻子半兩 沉香一分 藁本一分 丁子葉

凡五物切以水一斗五合煮取六合分三服一歲兒一服

半合隨兒大小增減水藥神驗

治小兒癰瘰方第百廿九

產後云海藻圓方

海藻一斤切以酒二斗漬之稍飲之

治小兒諸癰方第百卅

產後云以大膏和胡椒磨創良

治小兒癰方第百卅一

產後云治小兒癰瘰瘻久年不愈海藻圓方

海藻一斤去鹹切好以酒二斗漬之合日二三服盡滓

亦可作散服方寸匕

治小兒附骨疽方第百卅二

產後云凡小兒有附骨疽者招杞載近其身便大啼哭

治小兒諸瘡
產後之良膏和胡椒磨創良

治小兒瘰癧方第百廿一

瘰癧之治小兒瘰癧瘡久年不愈海藻酒方

海藻一斤去鹹切好酒三斗漬脹二合日二三遍盡滓

亦作散服方寸匕

治小兒附骨疽方第百廿二

產後之治小兒有附骨疽者招托裁近其身便大啼喚
即是文節有痛處或心支有不欲動搖如不隨狀

治之方初得即服漏蘆湯下之傳小豆薄

治小兒腦疽方第百廿三

產後之治小兒腦疽者指與他指相似人不知不覺治其毒
入藏數人宜審之腦疽者指端者其先作黑疤痛入心
也先刺指頭去惡血以艾灸七壯良

又方服犀角汁佳

又方服升麻汁

又方服葵根汁

又方服竹瀝汁

又方服豨薟汁

治小兒代指方第百廿四

產後之治代指者先腫飲熱色不黯也然後緣爪甲結

膿者脫爪也治之方

甘草湯熱漬之

又方芒消汁漬之

又方刺去血漬熱湯

又方以猪膏和鹽指甲周更而安若已膿者針去膿

治小兒疥瘡方第百廿五

病源論云繞至多變他所作其瘡裏有虫甚難見

小兒因乳養之人疥而得者

甘草湯契瘻之

又方芒消汁漬之

又方刺去血瘻契湯

熱內

又方以猪膏和塩指甲同炙而安若已膿者針去膿

治小兒疥瘻方第百廿五

病源論云統至多變他所作其瘻裏有田至其難見
小兒目乳養之人疥而條者

六全不燒竹葉末和鷄子白付之曰二

又方糲和胡粉塗之

又方亂髮灰和臘月猪脂付之

產後蜀椒五合湯以水一斗煮三沸去滓溫湯洗瘻食頃良

治小兒癰瘻方第百廿六

食頃良若痒不止復漬之

病源論云癰瘻由風邪與血氣相搏為癰小兒面

上生癰謂之為乳癰言乳汁積滯兒面而生仍以

乳汁洗之便矣

產後凡癰不指破上皮膚而藥瘻者不瘻

用黑毛牛天溫洗之良

又方未批白皮以苦酒和瘻之

又方胡椒粉熬令黃乾和酥塗上燥復瘻良

千金方批青皮搗和酥塗之

又云乾癰方為把根搗以猪脂和付之又以醋和佳

集驗方以水銀合胡椒傳之

又方蛇床子末和白膏傳之

治小兒浸淫瘻方第百廿七

病源論云小兒五藏有熱外為風濕所折發瘻

千金方竈中五二分煖灰一分末下猪脂和付之

產後取牛矢取汁塗之

又方以干牛天燒煙良

集驗方以水銀合胡粉傳之

又方蛇床子末和白膏傳之

治小兒浸淫瘡方第百廿七

病源論云小兒五藏有熱外為風濕所折發瘡

千金方竈中五二分發灰一分末下猪脂和付之

產後取牛矢便取汁塗之

又方以干牛天燒煙良

又方胡鷲葉末和水傳之

治小兒癩瘡方第百廿八

病源論云癩者風濕搏於血氣所成多著手足節腕間

下也此瘡之癢痛浸淫生長呼之為癩以其瘡有

細虫如烟虫

產後治小兒大人蝸疥百療不毛方

地榆五兩

練實五兩

桃皮五兩

苦參五兩

凡四物以水一斗煮取五升溫洗良並治癬

又方穀穗白皮一合

治小兒王初瘡方第百廿九

凡五物傳如以傳上

病源論云府藏有熱熏皮膚外為濕氣所乘則

變生瘡其熱偏盛者其瘡起之盛初生如麻子

須臾王大汁流潰爛如湯大所灼故名王初瘡

千金方小兒王初瘡者一身盡有如麻子小豆者戴膜

汁出者痛下痒下熱方

又方桃人熟搗和面脂塗之

又方牛屎灰付之

又方燒艾灰付之

產後治小兒黃爛瘡方

黃連 胡粉

右二物治下疳分等以麻油和塗之

治小兒月食瘡方第百卅

病源論云小兒耳鼻口角生割謂之月食割其瘡隨

又方桃人契搗和面脂之

又方牛屎灰付之

又方燒艾灰付之

產後治小兒黃爛瘡方

黃連 胡粉

右二物治下篩分等以麻油和塗之

治小兒月食瘡方第百卅

病源論云小兒耳鼻口面生創謂之月食創其瘡隨

月生死因以爲名也世云小兒見月初生以手指之

則令耳下生創改呼爲月食瘡也

千金方治小兒月食瘡方和胡椒塗之 又月蝕九竅皆有者方

又方燒蚯蚓金未和膏付之

葛氏方以五月五日蝦蟇屑和膏付之

產後取薤摩草汁塗上

又方劉槐枝煮取汁洗之

龍肉方猪脂和杏仁付之

徐之才方小藥皮搗爲末付之

治小兒凍瘡方第百卅一

病源論云小兒冬月爲寒氣傷於肌膚寒氣搏於

血氣之壅滯同所生創其創嫩腫而難是乃至皮肉

爛謂之爲凍瘡爛創

產後云小兒冬月涉水凍手足瘡瘡燥疼痛方

取麥糠煮金未洗瘡之

又方櫟木灰和漿湯洗之取汁清之

千金方生胡麻搗膏之

治小兒漆瘡方第百卅二

病源論云人無問男女大小有稟性不耐漆者見漆及新漆便

著漆毒令頭身面腫起隱癢色赤生瘡癢痛是也

治小兒乳癰方第百卅三

取麦糠煮熟洗漬之

又方樸木灰和漿湯洗之良

千金方生胡麻搗碎之

治小兒漆瘡方第百卅二

病源論云人無問男女大小有稟性不耐漆者見漆器便

著漆毒令頭身面腫起隱癢色赤生瘡癢痛是也

治小兒乳癰瘡面目皆腫身體作創癩方

又方芒消石槌石一著鹽湯中令消以洗之

又方煮柳葉洗之

又方搗薤白塗之

治小兒蠅螬傷瘡方第百卅三

千金方搗梨葉薄之

又方馬屎立散漿和付于易

產經云初得便以犀角水磨塗上

又方鹿角燒末苦酒和傳上

又方山豆屑苦酒和傳之

又方大麥飯甗傳上

又方胡椒以生油和塗之

治小兒惡瘡久不愈方第百卅四

病源論云夫身生瘡時是感熱衝外有風濕

相搏所生而有狹毒者其創久不愈名為惡瘡

產經燒地貳末以猪膏和傳之

又方豉末末傳上

集驗方院其文禪取汁浴兒勿令兒及母知大良

葛氏方燒乱髮并金月下立猪膏和傳之

又方梁上塵傳之

又方黃連胡粉水銀末和傳之若瘡燥和猪肪

產經燒地脂末以猪膏和傳之

又方豆豉未傳上

集驗方院其文禪取汁浴兒勿令兒及母知大良
葛氏方燒乱髮并金月下立猪膏和傳之

又方梁上塵傳之

又方黃連胡粉水銀末和傳之若瘡燥和猪肪
傳之

隨時方取桑樹孔中水洗之立見

范汪方燒雞屎付之

本草拾遺云廁中泥傳之

治小兒金創方第百卅五

病源論云小兒為金刃所傷謂之金創

產經云以毫反付創中

又方馬矢燒末著創中

又方燒綿末著創孔中

又方燒青布胡他傳之

今案按地蘇付之

治小兒湯火灼瘡方第百卅六

千金方煎煮大豆濃汁溫塗之無不瘳

又方白蜜塗日十遍

信以方千金反之
今案經云方以蜜能
冷水飲之

今案經心方以蜜解冷水飲之

產經石膏末付之立止

又方桑灰水和付之

治小兒竹木刺方第百卅七

產經治小兒竹木刺及針石出方

燒鹿角末水和塗創口立出不過一夕良

又方生牛膝根搗傳創口令自出

今案經心方以蜜角為小兒之

產經石膏末付之五

又方來灰水和付之

治小兒竹木刺方第百廿七

產經治小兒竹木刺及針不出方

燒鹿角末水和塗創口三出不過二夕良

又方生牛膝根搗傳創口令自出

又方醫白梅為梅傳之水和平之

又方王不留行瞿麥陳在服方寸七日自出

治小兒落床方第百廿八

葛代方治小兒落床隨地腹中有瘀血恆契不欲乳哺

歸寧方

大黃

黃連

蘇黃

各一箇半

以水二升煮取一升去滓內芒消分二三服當大下便去

五

治小兒食不知飽方第百廿九

病源論云小兒有嗜食已仍不知飽是又不生肌肉之腹大

其大便數而多此腸胃不守故也

千金方治小兒食不知飽方

鼠矢二七枚燒末服之

治小兒吐食方第百三十

千金方取宋一斤繩繫曳地行數里勿洗大炙散之良

治小兒吐五方第百三十一

病源論云小兒吐五者是有寒氣盛而虛熱乘於血

性得熱則風散妄行氣逆益隨氣上故吐五也

千金方油三分酒一分和日再服之

治小兒咳嗽方第百三十二

病源論云小兒咳嗽由乳哺无度月狹風冷傷於肺故

也

治小兒吐瀉方第百五十一

病後論云小兒吐瀉者是有寒氣盛而虛熱乘於血
性得熱則風散妄行氣逆益隨氣上故吐瀉也
千金方油三分酒一分和日再服之

治小兒咳嗽方第百五十二

病後論云小兒咳嗽由乳哺无度月狹風冷傷於肺故

也

產後治少小十目以上至五十日卒得咳嗽吐乳飲逆不乳方

牡桂三分

甘草十分

紫苑三分

麥門冬七分

凡四物以水二升煮取半升以綿署湯中漉兒中服之

之師乳哺

千金方燒淡竹瀝煮十沸小兒一服一合日五大人一升日五

今案大素丸九驗其方在第九卷大人方

張文仲方云孩子咳嗽宜与乳母藥方

竹葉切一升

石膏碎乳香

各四兩

貝母三兩

紫苑百部根

各二兩

石六物切以水八升煮取

二升分三服但乳母忌食蒜麵

新錄方治小兒嗽方

飲服紫苑末

儒深方云款冬花丸治小兒咳嗽方

款冬花一分

紫苑一分

桂心一分

伏龍肝一分

右四物下篩蜜和如棗核吞乳以日三夜二今

以大素丸治之尤驗其方在大人方中

治小兒食寒骨瘦方第百五十三

產後以大刀鐮磨喉二七過良

儒深方云數冬花凡治小兒驚風方

款冬花方 紫石英 桂心 赤 伏龍肝 香

石四物下篩蜜和如棗核蒸乳以白三夜二今

以大素丸治之尤驗其方
在大人中

治小兒食寒骨瘦方百五十三
產經以大刀鐵磨磨喉二七過良

又方燒無骨末水飲良 又方仍取投地裏骨者

又方燒麝香末以水服之即出 耳上目磨要出

治小兒食完骨瘦方百五十四

產經狸骨末服方寸匕良

又方取雄雞左右翅大毛各一枚燒末服一刀圭

治小兒食草芥便方百五十五

產經以好蜜少和之

又方未曬麥服方寸匕

又方猪膏如鷄子吞之石去復吞兩三過良

治小兒飲李梅漿便方百五十六

產經以水灌兒頭上取汁與飲之良 葛氏方同之

治小兒食段統咽方百五十七

產經取梳頭段燒末服一錢上 煎要方同之

治小兒誤吞錢方百五十八

產經楊皮服方寸匕

又方服蜜二十即出

又方艾一把以水五升煮取升頓服之下

治小兒誤吞針方百五十九

千金方吞落石來大盡出 今案產經羊少服之

產經多食服羊脂定及諸肥物自裹出之

治小兒誤吞鈎方百六十

產經以治小兒誤吞鈎鈎端着在手中莫引之方

又方服蜜二十即出

又方艾一把以水五升煮取升頓服之立下

治小兒誤吞針方第百五十九

千金方吞落石乘大蠶出治小兒誤吞針方今案產後羊少腹之

產後多食治小兒誤吞針方脂定及諸肥物自裹出之

治小兒誤吞鈎方第百六十

產後云治小兒誤吞鈎鈎端若在手申莫引之方

以珠若薏苡子貫著繩稍推令至鈎處少引即出

治小兒誤吞又方第百六十一

產後取菲曝令茶女煮不切食多大東

又方多食白糖自隨出之

治小兒誤吞銀方第百六十二

產後燒鷹羽數枚末服之家所養鴉羽之可用之

治小兒誤吞竹木方第百六十三

產後取布刀故鋸燒條屑中以女人大指爪二枚燒末

內酒中飲之良

醫心方卷第廿五

復水鏡前云治小兒瘡於大人異

治大丹方

蕎麥麵 黃塩各少許 水銀 牛乳各少許

右同研令極細塗之便見

治赤斑之瘡方

五龍子一條 赤土壹少許 牙屑 六分 薰陸香少許

無以醬金代之

右物細研以新汲井水調灌之立見

治燒豆瘡方

乾漆 炒新煙 人中白 瓦松灰 各少許 馬牙屑 一分

右並研令細空心冷漿水調一錢溫服之取吐為度吐了

治赤斑瘡方

五龍子一條 赤土^{少許} 牙屑^{六分} 薰陸香^{少許}

無以磨金代之

右物細研以新汲井水調灌之立見

治豌豆瘡方

乾漆^{炒新煙} 人中白^{瓦松灰} 各^{少許} 馬牙^有

右並研令細空心冷漿水調一錢溫服之取吐為度也

又服一錢利三五行其瘡自落

治小兒急疳痢瀉不止或膿或血或青或黃或作穗或頭髮墜落鼻乾哭極麤皮^{哭聲}云金髓散

黃連一兩宣州者為末用鷄子一介取清和連末

作餅子炙焙石中黃二分 烏餘糧 麝香

朱砂各^{少許} 香頭二介^{生去} 胎尖肉 豆蔻二介

訶子二介^{去核} 金牙石一分

右件物並為散空心以米飲下一歲兒一字五歲一錢
忌熱物

治小兒紫疳面模黑色身上或生青斑紫斑鼻内生瘡
腮陷手背脚背虛腫不脫肛不脫胎胎骨甚贅宜服
竹天黃丸方

天竹黃一分 朱砂一分 巴豆一粒去皮心

膜麤炒散出油 麝香^{少許} 香頭一顆生去胎尖

右五味俱研為末以蠟酥為丸如黃米大一歲兒一
丸空心溫米飲下如哭者一付下

忌熱麵食及一切熱物忌冷物